

【医師の意見書が必要な感染症】

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹 (はしか)	発症1日前から発しん出現後の 4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	症状が有る期間(発症前 24 時間 から発症後3日程度までが最も 感染力が強い)	症状が始まった日から5日以内に症状がなくなった 場合は、症状が始まってから7日目まで又は解熱後 3日を経過するまで
風しん	発しん出現の前7日から後7日 間くらい	発しんが消失してから
水痘 (水ぼうそう)	発しん出現1～2日前から痂皮 形成まで	全ての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫張後 4日	耳下腺の腫脹が消失してから
結核		感染のおそれがなくなってから
咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、充血等症状が出現した 数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した 数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してか ら
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出 現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること(抗 菌薬を決められた期間服用する。7日間服用後は医 師の指示に従う。)
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O 111等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、 48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも 菌陰性が確認されたもの